


Termo	Definição	Imagem
Aparelho auditivo retroauricular	Um aparelho auditivo retroauricular passa por cima e fica posicionado atrás da sua orelha. Um tubo conecta o aparelho auditivo a um molde auricular que fica posicionado dentro do seu canal auditivo.	
Cateter ou sonda	Um tubo flexível que é usado para drenar a urina da bexiga. É usado por algumas pessoas que não conseguem esvaziar a bexiga de maneira independente ou voluntária.	
Fragilidade	Fraqueza, fragilidade ou falta de energia. Ocorre com frequência à medida em que as pessoas envelhecem e sua saúde declina.	
Incontinência	Quando uma pessoa tem dificuldade ou não consegue controlar voluntariamente a sua bexiga ou intestino.	
Relógio com autofalante e sensível ao toque	Relógio que anuncia as horas verbalmente.	
Pessoal	Pessoas que trabalham em um serviço ou organização.	
Andador/andarilho com rodas	Andador/andarilho com quatro rodas	
Acidente vascular cerebral	Bloqueio do fluxo sanguíneo no cérebro. Ele pode resultar na perda de força ou paralisia de um lado do corpo, assim como em problemas de fala, sensibilidade, raciocínio e visão.	
Lista de Produtos Assistivos Prioritário da OMS	Uma lista de produtos assistivos prioritários que foi concebida pela Organização Mundial da Saúde. A lista é um modelo que os países podem usar para desenvolver as suas próprias listas nacionais de	

	produtos assistivos prioritários.	
Paralisia cerebral	Um conjunto de condições que afetam o movimento, o tônus muscular, o equilíbrio e a postura. A paralisia cerebral é um resultado de danos ao cérebro causados antes, durante ou pouco depois do nascimento.	
Síndrome de Down	Uma condição com a qual alguém pode nascer. A Síndrome de Down pode causar alguns problemas de saúde, desenvolvimento e dificuldades cognitivas (de raciocínio). Pessoas com Síndrome de Down podem ter características físicas particulares.	
Lesão medular	Danos à medula espinhal que geralmente são causados por uma doença ou acidente. Após uma lesão medular, as mensagens não podem ser transferidas pela medula espinhal entre o corpo e o cérebro. Frequentemente, as pessoas não podem se mover (ficam paralisadas) e não tem sensibilidade abaixo do nível da lesão.	