

Terme	Définition	Image
Prothèse auditive contour d'oreille	Une prothèse auditive contour d'oreille se pose à califourchon sur l'oreille, la partie principale étant logée derrière l'oreille. Un tube relie l'appareil à un embout fait sur mesure qui se place à l'intérieur du conduit auditif.	
Sonde	Tube souple utilisé pour drainer l'urine de la vessie. Elle est utilisée par des personnes qui ne peuvent pas vider leur vessie volontairement ou indépendamment.	
Fragile	Faible, fragile et manquant d'énergie. Cet état apparaît souvent quand une personne devient âgée et que sa santé se détériore.	
Incontinence	État d'une personne qui a des difficultés à contrôler sciemment sa vessie ou ses intestins, ou qui n'est plus en mesure de le faire.	
Montre parlante et tactile	Montre donnant l'heure oralement.	
Personnels	Personnes travaillant dans un service ou un établissement.	
Rollateur	Déambulateur à quatre roues.	
AVC	Blocage du flux sanguin dans le cerveau. Cela peut entraîner un affaiblissement ou une paralysie d'un côté du corps, ainsi que des troubles sensoriels, intellectuels, de la parole et de la vision.	
Liste des produits et aides techniques	Liste de produits d'assistance prioritaires établie par l'Organisation mondiale de la Santé. Elle peut servir de modèle aux pays souhaitant établir leurs propres listes de produits d'assistance prioritaires.	

prioritaires de l'OMS		
Paralysie cérébrale	Ensemble d'affections touchant les mouvements, la tonicité musculaire, l'équilibre et la posture. La paralysie cérébrale est le résultat de lésions sur le cerveau survenues avant, pendant ou peu après la naissance.	
Syndrome de Down	Trouble pouvant être présent à la naissance. Le syndrome de Down peut entraîner des complications de santé, des retards de développement et des difficultés cognitives. Les personnes atteintes du syndrome de Down peuvent présenter des caractéristiques physiques particulières.	
Lésion de la moelle épinière	Lésion de la moelle épinière, généralement due à un accident ou une maladie. Quand la moelle épinière est endommagée, les messages entre le corps et le cerveau ne peuvent plus transiter par la moelle épinière. Souvent, la personne ne peut plus bouger (elle est paralysée) et n'a plus de sensations en dessous de la lésion.	