

Термин	Определение	Изображение
Заушный слуховой аппарат	Заушный слуховой аппарат помещается за ушной раковиной. К нему с помощью звукопроводящей трубочки присоединен изготовленный на заказ ушной вкладыш, который вставляется в слуховой проход. Этот вкладыш проводит звук от слухового аппарата в ухо и обеспечивает его фиксацию.	
Катетер	Специальная мягкая трубка, предназначенная для выведения мочи из мочевого пузыря. Катетеры используются людьми, которые не могут опорожнить мочевой пузырь обычным способом.	
Общая слабость организма	Состояние организма, характеризующееся выраженной слабостью, когда из-за недостатка сил и энергии людям трудно или вообще не удается выполнять обычные повседневные дела. Такое состояние часто развивается в связи со старением организма и ухудшением здоровья.	
Недержание	Утрата или снижение способности произвольно контролировать мочеиспускание или опорожнение кишечника.	
Говорящие и/или тактильные часы	Часы, которые говорят время; позволяют узнать время на ощупь; или сочетают обе эти функции.	
Персонал	Люди, которые работают в различных учреждениях, службах и организациях.	
Роллатор (ходунок-роллатор)	Ходунки на четырех колесах	
Инсульт	Острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к поражению головного мозга. Инсульт может вызвать слабость или паралич одной стороны тела, а также различные нарушения речи,	

	органов чувств, мышления, зрения.	
Список приоритетных вспомогательных средств, разработанный ВОЗ	Перечень приоритетных вспомогательных средств, разработанный Всемирной организацией здравоохранения. Этот перечень является моделью, которую страны могут использовать для разработки своих собственных национальных перечней приоритетных вспомогательных средств.	
Церебральный паралич	Термин, используемый для обозначения группы непрогрессирующих нарушений двигательной активности, мышечного тонуса, равновесия и осанки, которые являются следствием повреждения головного мозга до, во время или вскоре после рождения.	
Синдром Дауна	Врожденная генетическая аномалия, которая может вызывать различные проблемы со здоровьем, развитием и мышлением. Лица с синдромом Дауна могут иметь внешний вид, характерный для людей с этой патологией.	
Травма спинного мозга (спинальная травма)	Повреждение спинного мозга, которое обычно развивается вследствие травмы или болезни. Спинальная травма приводит к прекращению передачи нервных сигналов по спинному мозгу ко всем органам тела, вследствие чего пострадавший часто утрачивает способность двигаться и чувствовать свое тело ниже уровня повреждения,	