

تصویر	تعریف	اصطلاح
 Hearing Aid	یک سمعک پشت گوش، بالای گوش شما قرار می‌گیرد. یک لوله، سمعک را به یک گوشی سفارشی به نام گوشواره متصل می‌کند که در کانال گوش شما قرار می‌گیرد.	سمعک پشت گوش
	یک لوله نرم که برای تخلیه ادرار از مثانه استفاده می‌شود. برخی افراد که نمی‌توانند مثانه خود را به‌طور مستقل یا به‌تنهایی خالی کنند، از آن استفاده می‌کنند.	سوند
	ضعیف، شکننده و بالانرژی اندک. اغلب با افزایش سن افراد و کاهش سلامت آنها اتفاق می‌افتد.	ضعف و شکنندگی
	زمانی که فرد در کنترل مثانه یا روده خود دچار مشکل می‌شود یا قادر به کنترل مثانه یا روده خود نیست.	بی‌اختیاری ادرار و یا مدفوع
	ساعتی که زمان را به‌صورت شفاهی اعلام می‌کند.	ساعت گویا
	افرادی که در یک سرویس یا سازمان کار می‌کنند.	کارکنان
	واکر با چهار چرخ	واکر چرخ‌دار
	انسداد جریان خون در مغز. این امر می‌تواند منجر به ضعیف یا فلج شدن یک طرف بدن و همچنین مشکلاتی در صحبت کردن، احساس کردن، فکر کردن و دیدن شود.	سکته مغزی
	فهرستی از محصولات کمکی اولویت‌دار که توسط سازمان جهانی بهداشت طراحی شده است. این فهرست مدلی است که کشورها می‌توانند از آن برای تهیه فهرست محصولات کمکی با اولویت ملی خود استفاده کنند.	فهرست محصولات کمکی اولویت‌دار سازمان جهانی بهداشت
	گروهی از شرایط که بر حرکت، توان عضلانی، تعادل و وضعیت بدن تأثیر می‌گذارد. فلج مغزی نتیجه آسیب مغزی قبل، حین یا بلافاصله پس از تولد است.	فلج مغزی

سندرم داون	شرایطی که ممکن است فرد با آن متولد شود. سندرم داون می‌تواند باعث برخی مشکلات سلامتی، رشد و شناختی (تفکر) شود. افراد مبتلا به سندرم داون ممکن است ویژگی‌های ظاهری (جسمی) خاصی داشته باشند.
آسیب نخاعی	آسیب به نخاع که معمولاً در اثر تصادف یا بیماری ایجاد می‌شود. پس از آسیب نخاعی، پیام‌ها نمی‌توانند در طول نخاع بین بدن و مغز حرکت کنند. اغلب فرد نمی‌تواند حرکت کند (فلج می‌شود) و نمی‌تواند زیر سطح آسیب‌دیده را احساس کند.