

用語	定義	画像
耳かけ型補聴器	耳かけ型 (BTE) 補聴器は耳の上を渡して引っかけ、耳の後ろに置く。補聴器とイヤーマールド [耳型] とよばれる外耳道にフィットするよう個別製作したイヤピースをチューブが接続している。	<p>補聴器</p> 
カテーテル	尿を膀胱から排出するために用いる柔らかいチューブ。自力で、または随意に膀胱を空にできない人が用いることがある。	
フレイル (虚弱)	弱く、もろく、活力に乏しいこと。加齢に従って健康が低下するにつれてよく起こる。	
失禁	膀胱や腸を随意に制御するのが難しいかできないこと。	
音声/触覚式時計	時刻をことばで知らせる時計。	
職員	サービス事業や組織で働く人。	
歩行車 [rollator]	4 輪を備えた歩行器 [walker]。	
脳卒中	脳の血流が阻害されること。その結果、身体の片側の力が弱くなるか麻痺するほか、言語、感覚、思考、視覚に問題が生じうる。	
WHO 優先的支援製品リスト	世界保健機関が立案した優先度が高い支援製品の一覧。このリストは、各国が国内の優先的支援製品リストを策定する際に見本として活用できる。	

<p>脳性麻痺</p>	<p>動作、筋緊張、バランス、姿勢に影響を及ぼす一群の疾患。脳性麻痺は出生前、出生時、出生直後の脳損傷の結果である。</p>	
<p>ダウン症</p>	<p>先天性疾患の一つ。ダウン症は、健康、発達、認知(思考)における困難の原因となりうる。ダウン症がある人は、特有の身体的特徴を伴う場合がある。</p>	
<p>脊髄損傷</p>	<p>脊髄が損傷されることで、通常は事故や病気によって起こる。脊髄損傷後は身体と脳の中の脊髄に沿った伝達ができなくなる。損傷より下位が動かせなくなり(麻痺し)、感覚が失われる場合が多い。</p>	