Learning on TAP

Tecnología de apoyo
Formulario de exploración: Salud auditiva

1. Datos de la persona	
Nombre: ✎	Apellido: ✎
Edad: 5-17 ☐ 18-39 ☐ 40-54 ☐ 55-64 ☐ 65+ ☐ *Menores de 5 años ☞ derive a un especialista del oído y la audición.*	Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐ Otro ☐
Dirección: ✎	Teléfono: ✎

2. Preguntas exploratorias			
Pregunte:	**Sí**	**No**	
¿Utiliza actualmente algún producto de apoyo para la audición que le haya sido provisto por un servicio de fonoaudiología?	☐	☐	**Si la respuesta es "Sí",** → continúe con la exploración y ☞ derive al proveedor del servicio de fonoaudiología. **Si la respuesta es "No"** → continúe.
¿Le cuesta comunicarse hablando?	☐	☐	**Si la respuesta es "Sí"** a alguna de las preguntas ☞ derive a un especialista del oído y la audición. **Si la respuesta es "No"** a todas las preguntas → continúe.
¿Ha notado algún cambio **repentino** en su audición en los últimos tres meses?	☐	☐	
¿**A menudo** nota alguna secreción (líquido) que sale de uno o de ambos oídos?	☐	☐	

3. Chequeo de la salud auditiva			
Examine con detenimiento la parte externa de cada oído (las orejas).			
¿Las orejas tienen buen aspecto? *(No hay signos de lesión ni infección; se observan el pabellón auricular y el conducto auditivo).*			**Sí** ☐→ Continúe **No** ☐☞ Derive al especialista del oído y la audición y haga otra cita para chequear la salud auditiva tras el tratamiento.
Examine con detenimiento el interior de cada oído con un otoscopio.	**Izq.**	**Der.**	
Verifique si hay alguna secreción del oído o cualquier signo de infección. *(Sangre, pus, líquido, enrojecimiento, sensibilidad)*	☐	☐	**Si hay signo de infección,** →seque bien los oídos con un paño antes de la otoscopia. No pase el paño seco si hay dolor intenso. **Si el oído se ve sano tras pasar el paño seco→,** continúe. **Si no se ve sano** ☞ derive a un especialista del oído y la audición y haga otra cita para chequear la salud auditiva.
Oído taponado por cerumen.	☐	☐	**De ser así, evalúe hacer un lavado de oídos.** Antes del lavado, → compruebe si la persona: ☐ Ha tenido una operación reciente del oído. ☐ Se sabe que ha tenido una perforación en el tímpano. ☐ Tiene una infección de oído. ☐ Tiene dolor de oído. **Si ha tenido algo de lo anterior** → no hacer el lavado de oído. **Si no** → hacer el lavado de oído. **Si el lavado del oído es satisfactorio** → siga con la exploración. **Si el lavado del oído no es satisfactorio** ☞ derive a un especialista del oído y la audición.
Algún cuerpo extraño en el conducto auditivo.	☐	☐	
Perforación en el tímpano	☐	☐	**Si la observa** ☞ derive a un especialista del oído y la audición.
Persona sana, sin problemas de oídos.	☐	☐	**Si ambos oídos están sanos** → planifique una prueba de la capacidad auditiva.

☞ Se recomienda una derivación. ✎ Escriba sus notas aquí

4. Otros productos de apoyo para la audición		
Averigüe si la persona tiene dificultades con lo siguiente:	Visión ☐ Movilidad ☐ Autocuidado ☐ Comunicación ☐ Cognición (razonamiento/memoria) ☐	**De ser así,** ⟶considere otros producto de apoyo o la derivación a otros servicios

5. Planificación		
Exploración:	Visión ☐ Movilidad ☐ Autocuidado ☐ Comunicación ☐ Funciones cognitivas (razonamiento/memoria) ☐	
Evaluación:	Prueba de la capacidad auditiva ☐	
Derivación:	Profesional especializado en el oído y la audición ☐ Servicio de fonoaudiología ☐ Otros ✎	
Seguimiento:	Repetir la exploración de la salud auditiva ☐	Fecha de la consulta de seguimiento: ✎

Cómo hacer la revisión de la salud auditiva		
Paso	**Qué hacer en caso de problemas de oído**	**Qué hacer si no hay ningún problema en los oídos**
1. Examine las orejas de la persona (la parte externa de los oídos, por delante y por detrás, en cada lado)	• Si se observan signos relacionados con: ◦ **Lesión o infección.** ◦ **Ausencia o forma muy diferente** de la oreja o del conducto auditivo. ☞ Derive a un especialista del oído y la audición. • Si la persona tiene **una lesión o una infección** ⟶ pídale que vuelva para hacerse una nueva exploración de la salud auditiva tras el tratamiento correspondiente. • Si hay signos de **secreción** ⟶ limpie el oído con un paño seco.	Si **la parte externa de los oídos está sana** ⟶ continúe. Examine el interior de los oídos de la persona.
2. Examine el interior de los oídos de la persona con un otoscopio (en cada lado)	• Si hay signos de **infección** ☞ derive a un especialista del oído y la audición. Pídale que vuelva para hacerse una nueva exploración de la salud auditiva tras el tratamiento correspondiente. • Si observa signos de **perforación del tímpano** ☞ derive a un especialista del oído y la audición. • Si **el conducto auditivo está taponado por cerumen o hay un cuerpo extraño** ⟶ haga un lavado del oído. Verifique que sea seguro continuar antes de proceder con el lavado.	Si **el interior del oído está sano** ⟶ planifique una prueba de la capacidad auditiva.
3. Si es necesario, proceda con un lavado del oído.	• Si el lavado del oído **no es satisfactorio** ☞ derive a un especialista del oído y la audición y pídale que vuelva para hacerse una nueva exploración de la salud auditiva tras el tratamiento correspondiente.	Si el lavado del oído **es satisfactorio** y el oído está sano ⟶planifique una prueba de la capacidad auditiva.